

# DORAX 1%

## ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO

Para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales y pulmonares, miasis, nuca, piojos, ácaros de la sarna y garrapatas. Uso en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos, nematodos, gastrointestinales y parásitos pulmonares.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de DORAX 1% solución inyectable contiene:

DORAMECTINA	10 mg
EXCIPIENTES C.S.P	1,0 mL

### VIA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea o Intramuscular profunda.

### DOSIFICACIÓN

**Bovinos, Ovinos y Caprinos:** 1 ml por cada 50 Kg de peso vivo. En animales mayores de 500 Kg no aplicar más de 10 ml por sitio de aplicación. **Porcinos:** 1 ml por cada 33 Kg de peso vivo.

### TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 50 días después de finalizado el tratamiento. **No administrar en vacas, ovejas o cabras cuya leche sea destinada, para el consumo humano, ni 50 días antes del parto.** En porcinos los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 50 días después de finalizado el tratamiento.

### PRESENTACIONES



Reg. ICA 9699-MV

