OX 200 L.A.

ANTIBIÓTICO AMPLIO ESPECTRO LARGA ACCIÓN

Para la prevención y tratamiento de infecciones causadas por bacterias grampositivas, gramnegativas, ricketsias (anaplasmas) y micoplasmas causadas por: Bovinos: Controla Anaplasma spp,RickettsiQ, Streptococcus spp (mastitis, metristis, neumonías),Clostridium spp, Pasteurella spp, Leptospira spp, Campylobacter spp, Listeria spp, Haemophilus spp, Shigella spp. Ovinos y Caprinos: Pododermatitis, neumonías. Porcinos: Enteritis bacteriana, infecciones, Mastitis, Metritis, Agalactia, Infecciones post quirúrgicas, abscesos, dermatitis, artritis, mastitis, leptospirosls.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada ml de **OX 200 L.A.** contiene:

OXITETRACICLINA BASE	*50 MG*
EXCIPIENTES C.S.P.	*1,0 ML*

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: Aplicar vía intramuscular profunda exclusivamente.

DOSIFICACIÓN

Aplicar 20 mg de oxitetraciclina base por cada Kg de peso vivo. En la práctica usar 1 ml de **OX 200 L.A**. por cada 10 Kg de peso vivo en cada aplicación.

PRECAUCIÓN

No inyectar más de 10 ml en bovinos y no más de 5 ml en ovinos, caprinos y porcinos por sitio de aplicación.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después

PRESENTACIONES

Frasco **100 ML** *Frasco* **250 ML** *Frasco* **500 ML**

Reg. ICA 9368-MV