

RICOZOL 17,5%

ANTIPARASITARIO INTERNO

Antiparasitario Interno inyectable de amplio espectro. Solución Inyectable para el control de parásitos gastrointestinales, pulmonares, fases adultas, larvas y huevos, ocasionadas por: *Cooperia sp.*, *Heamonchus sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomum sp.*, *Dictyocaulus sp.* Y Fasciola Hepática. Uso en Bovinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de **RICOZOL 17,5%** Solución Inyectable contiene:

| | |
|-------------------|--------|
| RICOBENDAZOL | 175 mg |
| EXCIPIENTES C.S.P | 1 mL |

VIA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea exclusivamente.

DOSIFICACIÓN

Administrar de 3,5 a 3,75 mg/Kg de peso vivo. En la práctica aplicar 1mL de **RICOZOL 17,5%** por cada 50 Kg de peso vivo. En caso de fasciola hepática y ostertagias inhibidas administrar 7,5 mg/Kg de peso vivo. En la práctica aplicar 2 mL de **RICOZOL 17,5%** por cada 50 Kg de peso vivo.

PRECAUCIONES

No inyectar más de 10 mL en un solo punto de aplicación. Algunos animales pueden llegar a manifestar edema en el punto de aplicación, el cual cede en breve lapso sin medicación alguna.

No administrar a animales en el tercio inicial de la gestación ni a animales débiles, con estrés o estado febril.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.

PRESENTACIONES



Reg. ICA 9745-MV

