

# OX 200 L.A.

## ANTIBIÓTICO AMPLIO ESPECTRO LARGA ACCIÓN

Para la prevención y el tratamiento de infecciones causadas por bacterias grampositivas, gramnegativas, rickettsias (anaplasmas) y micoplasmas causadas por: Bovinos: Controla Anaplasma spp, Rickettsia, Streptococcus spp (mastitis, metritis, neumonías), Clostridium spp, Pasteurella spp, Leptospira spp, Campylobacter spp, Listeria spp, Haemophilus spp, Shigella spp. Ovinos y Caprinos: Pododermatitis, neumonías. Porcinos: Enteritis bacteriana, infecciones, Mastitis, Metritis, Agalactia, Infecciones post quirúrgicas, abscesos, dermatitis, artritis, mastitis, leptospirosis.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de OX 200 L.A. contiene:

OXITETRACICLINA BASE	200 mg
EXCIPIENTES C.S.P.	1,0 mL

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos, Ovinos, Caprinos y Porcinos: Aplicar vía intramuscular profunda exclusivamente.

### DOSIFICACIÓN

Aplicar 20 mg de OXITETRACICLINA BASE por cada Kg de peso vivo. En la práctica usar 1 mL de OX 200 L.A. por cada 10 Kg de peso vivo en cada aplicación.

### PRECAUCIÓN

No inyectar más de 10 mL en bovinos y no más de 5 mL en ovinos, caprinos y porcinos por sitio de aplicación.

### TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 6 días después no deben destinarse al consumo humano.

### PRESENTACIONES



Reg. ICA 9368-MV

