

# TILMIX

## ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO

Antibiótico macrólido oral de amplio espectro. Indicado para el tratamiento y el control de las infecciones producidas por patógenos respiratorios primarios susceptibles (ERC). Aves: Mycoplasma gallisepticum y Mycoplasma sinoviae (micoplasmosis), Ornithobacterium rhinotracheale, además controla Sthaphylococcus aureus pasteurella spp. Uso en aves y cerdos.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 1,0 mL de TILMIX contiene:

TILMICOSINA	250 mg
EXCIPIENTES C.S.P.	1,0 mL

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral en agua de bebida.

### DOSIFICACIÓN

TABLA PARA CALCULAR LA CANTIDAD DE TILMIX SOLUCIÓN ORAL® EN EL AGUA DE BEBIDA PARA AVES, DOSIS 15 A 20 MG/KG DE PESO VIVO.						
EDAD EN SEMANAS PESO X AVE (GRAMOS)	0 60-65	1 140-160	2 400-450	3 700-750	4 1000-1050	5 1500-1600
CONSUMO DE AGUA EN LITROS X 1000 AVES	30	50	100	150	200	280
TILMIX SOLUCIÓN ORAL® ML X 1000 AVES	4-5	9-12	26-34	44-58	60-82	93-124

En la práctica: Aves: 0,3 mL, por cada litro de agua bebida por 5 días consecutivos. Cerdos: 4-5 mL, de TILMIX x 10 Litros de agua de bebida durante 5 días consecutivos.

### PRECAUCIÓN

No permitir el acceso de equinos al agua de bebida que contiene el producto. El contacto con la piel puede causar irritación o sensibilización.

### TIEMPO DE RETIRO

Las aves tratadas, no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en aves durante el periodo de postura cuyos huevos se destinen al consumo humano.

### PRESENTACIONES

Caja x 12 goteros 10 mL    Frasco 50 mL    Frasco 100 mL    Frasco 250 mL



Reg. ICA 9494-MV

