

TRIDIAZIN ORAL

ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO

Para el tratamiento y el control de enfermedades causadas por bacterias gram positivas y gram negativas que producen infecciones digestivas y respiratorias. Uso en Aves (pollos y pollonas), Caninos, Porcinos, Bovinos, Equinos y Ovinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de TRIDIAZIN Suspensión Oral contiene:

TRIMETOPRIM MICRONIZADO	8,0 g
SULFADIAZINA SÓDICA	40,0 g
EXCIPIENTES C.S.P.	100 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Suministrar vía oral directamente o disuelto en el agua de bebida.
En aves: 25-30 mg/kg_ Ver la siguiente tabla

CANTIDAD DE AGUA POR 1 ML DE TRIDIAZIN SUSPENSIÓN ORAL®					
TIPO DE AVES	POLLAS Y PONEDORAS		POLLOS DE ENGORDE		
EXCIPIENTES C.S.P.	1 DÍA A 15 SEMANAS SESEMANAS	MÁS DE 16 SEMANAS	1 DÍA A 3 SEMANAS	4 A 5 SEMANAS	6 A 8 SEMANAS
LITROS DE AGUA	3.0	2.5	3.0	2.5	2.0

En bovinos, equinos, ovinos y caprinos: Administrar 3 mL/50 kg de peso vivo diariamente, durante 5 días.
En Porcinos: Administrar 1 ml por cada 20 kg de peso vivo directamente o disolver 10 mL por cada 15 litros de agua de bebida, diariamente durante 5 días. En Perros: Suministrar 0,5 mL por cada 8 kg de peso VIVO cada 12 horas durante 5 días. Una vez consumida el agua medicada se debe suministrar agua pura a los animales por el resto del día.

PRECAUCIÓN

La asociación Trimetoprim + Sulfa no debe administrarse por más de 14 días.
No vierta su contenido en fuentes de agua para consumo humano o animal.
El contacto con la piel puede causar irritación o sensibilización.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y hasta 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. No administrar en aves cuyos huevos se destinen a consumo humano durante el período de postura.

PRESENTACIONES

Caja x 12 goteros
10 mL

Frasco
50 mL

Frasco
100 mL

Garrafa
250 mL



Reg. ICA 9493-MV

