

TRIDIAZIN INYECTABLE

ANTIMICROBIANO AMPLIÓ ESPECTRO

Está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas producidas por: *Streptococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Corynebacterium* sp., *Escherichia coli*., *Haemophilus* sp., *Fusobacterium* sp., *Pasteurella* sp., *Actinobacillus* sp., *Actinomyces* sp., *Aerobacter* sp., *Campilobacter* sp., *Klebsiela* sp., *Bordetella* sp.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de **TRIDIAZIN INYECTABLE** contiene:

TRIMETOPRIM MICRONIZADO	80,0mg
SULFADIAZINA SÓDICA	400.0mg
Excipientes c.s.p	1,0mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar Vía intramuscular exclusivamente

DOSIFICACIÓN

La dosis requerida por cada Kg de peso vivo es de 2,4 mg de Trimetoprim y 12 mg de Sulfadiazina sódica contenidos en 0,03 mL de **TRIDIAZIN INYECTABLE**. En la práctica aplicar vía intramuscular 1 mL de **TRIDIAZIN INYECTABLE** por cada 30Kg de peso vivo cada 24 horas durante 3 a 5 días. En Bovinos no administrar más de 20 mL de la suspensión por sitio de aplicación.

En infecciones severas se recomienda incrementar la dosis práctica a 1 mL por cada 20 kg de peso vivo.

PRECAUCIÓN

Consérvese en sitio fresco y protegido de la luz, no reutilizar los envases, ni verter el contenido en fuentes de agua, para consumo humano o animal. No almacenar a temperaturas por encima de los 30 grados centígrados

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 10 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado este, no debe suministrarse para el consumo humano.

PRESENTACIONES



Reg. ICA 9664-MV

