

SECADO

PREVENCIÓN Y CONTROL

De mastitis durante el periodo de secado. Mayor distribución, adherencia y persistencia de la actividad de los antibióticos en el tejido intramamario. Óptima regeneración y recuperación, gracias a los excipientes presentes en su exclusiva formulación. Uso en Bovinos.



Reg. ICA 9467-MV

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 1,0 mL de SECADO contiene:

LINCOMICINA HCL (EQUIVALENTES A LINCOMICINA BASE)	220 mg
NEOMICINA SULFATO (EQUIVALENTES A NEOMICINA BASE)	740 mg
Excipientes c.s.p. para 1 jeringa por	10 g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

DOSIFICACIÓN

En el último día de la lactancia, después de un ordeño a fondo, limpiar, desinfectar y secar los pezones cuidadosamente, aplicar la totalidad del contenido de una jeringa (10 g). Realizar un masaje ascendente suave para asegurar la distribución del medicamento.

PRECAUCIÓN

No suministrar en vacas en periodo de lactancia. No usar dentro de los treinta (30) días anteriores al parto. No administrar en vacas cuya leche sea destinada al consumo humano, ni durante el periodo de lactancia.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no se deben sacrificar para consumo humano sino hasta 42 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES

