

PREDOL

ANALGÉSICO ANTIPIRETICO ANTIINFLAMATORIO

Analgésico, antiinflamatorio, antipirético, no esterooidal, en procesos músculo esqueléticos y osteoarticulares de origen no infeccioso. Uso en Bovinos, Equinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 1 mL de **PREDOL** contiene:

KETOPROFENO	100 mg
EXCIPIENTES C.S.P.	1 mL

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular, intravenosa o subcutánea

DOSIFICACIÓN

Bovinos: 3 mg/Kg de peso vivo, en la práctica aplicar 3 mL por cada 100 Kg de peso vivo durante 3 a 5 días, vía intramuscular o intravenosa. **Equinos:** 2.2 mg/Kg de peso vivo, en la práctica aplicar 1 mL por cada 45 Kg de peso vivo durante 3 a 5 días, vía intravenosa. **Porcinos:** 3 mg/Kg de peso vivo, en la práctica aplicar 3 mL por cada 100 Kg de peso vivo durante 3 a 5 días, vía intramuscular. **Caninos y felinos:** 2 mg/Kg de peso vivo, en la práctica aplicar 0.2 mL por cada 10 Kg de peso vivo, durante 1 a 3 días, vía intramuscular, intravenosa o subcutánea. La frecuencia y duración del tratamiento pueden ser modificadas a criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIÓN

No se debe asociar con otros AINES, corticoides, diuréticos, ni anticoagulantes. No se debe usar en pacientes con deficiencias renales, ni con úlceras gástricas.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento. No tiene tiempo de retiro en leche.

PRESENTACIONES

Caja x 12 unidades
10 mL

Frasco
50 mL

Frasco
100 mL



Reg. ICA 9664-MV

