

# GANACLOS 11 MP +BOTULISMO

## BACTERINA TOXOIDE COMBINADA

Contra el carbón, pasteurelisis y botulismo para la prevención de botulismo, enterotoxemia o Riñon pulposo, Hepatitis infecciosa necrosante, Carbon sintomático, Gangrena gaseosa, Edema maligno, Pasteurelisis bovina y Neumonía bovina para uso de Bovinos, Ovinos, Caprinos.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada dosis de 5 mL de vacuna antes de inactivar contiene:

8 Cepas Clostridium	
Clostridium chauvoei	5 x 10 <sup>9</sup> UFC
Clostridium septicum	2.5 UI de antitoxina
Clostridium perfringens tipo A	2.0 UI de antitoxina
Clostridium perfringens tipo B	2.0 UI de antitoxina
Clostridium perfringens tipo C	2.0 UI de antitoxina
Clostridium perfringens tipo D	2.0 UI de antitoxina
Clostridium novyi tipo B	0.5 UI de antitoxina
Clostridium sordellii	1.0 UI de antitoxina
3 Cepas pasteurella	
Pasteurella multocida	5 x 10 <sup>9</sup> UFC
Mannheimia hemolytica tipo A1	1 x 10 <sup>9</sup> UFC
Mannheimia hemolytica tipo A2	1 x 10 <sup>9</sup> UFC
2 TOXOIDES BOTULISMO	
Clostridium botulinum tipo C	
Clostridium botulinum tipo D	

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea en:

**Bovinos: 5 mL por animal**

**Ovinos y Caprinos: 2 mL por animal**

- En primo vacunación aplicar la primera dosis entre 3 y 4 meses de edad.

- Revacunar a los 21 días y luego semestralmente para mantener niveles adecuados de protección.

- En hembras gestantes, aplicar en el último tercio de la gestación, para producir una excelente inmunidad calostrual.



Reg. ICA 10009-BV

### ADVERTENCIAS

*Esta vacuna, por ser inactivada no debe producir reacciones post vacunales;* sin embargo, en animales susceptibles se pueden presentar reacciones anafilácticas posteriores a su aplicación se recomienda tratamiento de las mismas con antihistamínicos y epinefrina a las dosis recomendadas por el Médico Veterinario.

### PRESENTACIONES

