

VACUNA INMUNOCLOS 11 MP

BACTERINA TOXOIDE POLIVALENTE

Previene Clostridiosis y Pasteurelosis. Para la prevención de enterotoxemia o Riñon pulposo, Hepatitis infecciosa necrosante, Gangrena gaseosa, edema maligno, Pasteurelosis bovina y Neumonía bovina, causadas por Pauteurellas. Uso en Bovinos, Ovinos y Caprinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada dosis de 5 mL de vacuna antes de inactivar contiene:


8 CEPAS CLOSTRIDIUM	
CLOSTRIDIUM CHAOUVOEI	5 X 10 ⁹ UFC
CLOSTRIDIUM SEPTICUM	2.5 UI DE ANTITOXINA
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO A	2.0 UI DE ANTITOXINA
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO B	2.0 UI DE ANTITOXINA
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO C	2.0 UI DE ANTITOXINA
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO D	2.0 UI DE ANTITOXINA
CLOSTRIDIUM NOVYI TIPO B	0.5 UI DE ANTITOXINA
CLOSTRIDIUM SORDELLII	1.0 UI DE ANTITOXINA

3 CEPAS PASTEURELLA	
PASTEURELLA MULTOCIDA	5 X 10 ⁹ UFC
MANNHEIMIA HAEMOLYTICA TIPO A1	1 X 10 ⁹ UFC
MANNHEIMIA HAEMOLYTICA TIPO A2	1 X 10 ⁹ UFC

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía subcutánea en: **Bovinos:** 5 mL por animal. **Ovinos y Caprinos:** 2 mL por animal. En primo vacunación aplicar la primera dosis entre 3 y 4 meses de edad. **Revacunar a los 21 días y luego semestralmente para mantener niveles adecuados de protección. En hembras gestantes:** Aplicar en el último tercio de la gestación, para producir una excelente inmunidad calostrál.

PRESENTACIONES



Reg. ICA 10010-BV

