

NEUMODIAR

PREVENCIÓN DE LAS NEUMOENTERITIS
 Causadas por *Pasteurella Multocida*. Prevención de diarreas producidas por *Escherichia coli* y *Salmonella*. Uso en Bovinos, Equinos, Ovinos y Porcinos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de producto contiene:

| NEUMOENTIRITIS O PESTE BOBA | |
|-------------------------------|--------------------------|
| <i>PASTEURELLA MULTOCIDA</i> | 5 X 10 ⁹ UFC |
| <i>ESCHERICHIA COLI</i> | 3 X 10 ⁸ UFC |
| <i>SALMONELLA ENTERITIDIS</i> | 2 X 10 ¹⁰ UFC |
| <i>SALMONELLA DUBLIN</i> | 2 X 10 ¹⁰ UFC |
| <i>SALMONELLA NEWPORT</i> | 2 X 10 ¹⁰ UFC |
| C.S.P. | |

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar 2 mL vía subcutánea o intramuscular.

DOSIS

Hembra gestante: Aplicar subcutánea o intramuscular 2 dosis con intervalo de 21 días, entre la 5a y 3a semana de parto, **revacunar anualmente, con solo una dosis, 3-4 semanas preparto.** **Crías:** Aplicar 2 mL por vía subcutánea o intramuscular a los 30 días de edad. **Revacunar 21 días después de la primera aplicación.**

PRESENTACIONES



Reg. ICA 9953-BV

