

DORAX 1%

ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO

Para el tratamiento y el control de nematodos gastrointestinales y pulmonares, miasis, nuca, piojos, ácaros de la sarna y garrapatas. Uso en bovinos ovinos, caprinos y porcinos, nematodos, gastrointestinales y parásitos pulmonares.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de DORAX 1% solución inyectable contiene:

| | |
|-------------------|--------|
| DORAMECTINA | 10 mg |
| EXCIPIENTES C.S.P | 1,0 mL |

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea o Intramuscular profunda.

DOSIFICACIÓN

Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 mL por cada 50 Kg de peso vivo. En animales mayores de 500 Kg no aplicar más de 10 mL por sitio de aplicación. **Porcinos:** 1 mL por cada 33 Kg de peso vivo.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 50 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar en vacas, ovejas o cabras cuya leche sea destinada, para el consumo humano, ni 50 días antes del parto.

En porcinos los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 50 días después de finalizado el tratamiento.

PRESENTACIONES

Frasco
50 mL

Frasco
100 mL

Frasco
250 mL

Frasco
500 mL



Reg. ICA 9699-MV

