

MODECTYN

ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO

MODECTYN solución inyectable se encuentra indicado para el tratamiento y el control de Parásitos gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia curticei* (*mcmasteri*), *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Trichuris spp* (sólo adultos). Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*. Parásitos externos: Sarna: *Psoroptes ovis* (*Psoroptes communis var. bovis*). Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Bovicola* (*Damalinia*) *bovis*. Garrapatas: *Rhipicephalus microplus*. Mosca del cuerno: *Haematobia irritans*.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de MODECTYN solución inyectable, contiene:

Moxidectina	10 mg
EXCIPIENTES C.S.P	1,0 mL

INDICACIONES

Solución inyectable se encuentra indicado para el tratamiento y control de Parásitos gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia curticei* (*mcmasteri*), *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Trichuris spp* (sólo adultos). Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*. Parásitos externos: Sarna: *Psoroptes ovis* (*Psoroptes communis var. bovis*). Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Bovicola* (*Damalinia*) *bovis*. Garrapatas: *Rhipicephalus microplus*. Mosca del cuerno: *Haematobia irritans*.

MODECTYN controla infestaciones y provee control prolongado frente a nematodos gastrointestinales (*Ostertagia ostertagi*) por 35 días después del tratamiento, para nematodos pulmonares (*Dictyocaulus viviparus*) por 42 días después del tratamiento y protege por 28 días contra garrapatas [*Boophilus microplus* (*Rhipicephalus microplus*)].

DOSIFICACIÓN

Administrar a una dosis de 0,2 mg por kilogramo de peso vivo; en la práctica aplicar 1 mL de **MODECTYN** por cada 50 kg de peso vivo. Para asegurar la administración de la dosis correcta, se debe determinar el peso corporal del animal de manera precisa. El intervalo de administración queda a criterio del Médico Veterinario.



Reg. ICA 10817-MV



MODECTYN

ANTIPARASITARIO INTERNO Y EXTERNO

MODECTYN solución inyectable se encuentra indicado para el tratamiento y el control de Parásitos gastrointestinales (estadios inmaduros y adultos): *Ostertagia ostertagi* (incluyendo larvas inhibidas), *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Cooperia curticei* (*mcmasteri*), *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Trichuris* spp (sólo adultos).
 Nemátodos pulmonares: *Dictyocaulus viviparus*.
 Parásitos externos: *Sarna*: *Psoroptes ovis* (*Psoroptes communis* var. *bovis*).
 Piojos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, *Bovicola* (*Damalinia*) *bovis*.
 Garrapatas: *Rhipicephalus microplus*.
 Mosca del cuerno: *Haematobia irritans*.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar por vía subcutánea

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 65 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a bovinos en producción de leche destinada al consumo humano. No administrar en vacas lecheras ni en hembras gestantes 60 días antes del parto. Administrar únicamente por vía subcutánea. No administrar en becerros menores de ocho semanas o en animales afectados por desnutrición o enfermedades infecciosas. No administrar concomitantemente con otros productos. **Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz a una temperatura inferior a los 30°C.**

PRECAUCIONES

Durante la aplicación del producto evite el contacto directo del mismo con la piel y los ojos. Lavarse las manos después de la aplicación del producto. No fumar, beber o comer mientras se esté manipulando el producto.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.

PRESENTACIONES

Frasco
50 mL

Frasco
250 mL

Frasco
500 mL



Reg. ICA 10817-MV

