# **POLYCLOS P**

## **BACTERINA TOXOIDE**

Para la prevención de: Carbón sintomático. Gangrena gaseosa. Edema maligno. Enterotexemia o Riñón pulposo. Hepatitis necrótica y Pasteurelosis. Uso en Bovinos, Ovinos y Caprinos.

# **COMPOSICIÓN GARANTIZADA**

Cada mL de producto contiene:

5 CEPAS CLOSTRIDIUM	
CLOTRIDIUM SEPTICUM	2.5 UI DE ANTITOXINA
CLOTRIDIUM PERFRINGENS TIPO D	2.0 UI DE ANTITOXINA
CLOTRIDIUM NOVYI TIPO B	0.5 UI DE ANTITOXINA
CLOTRIDIUM SORDELLII	1.0 UI DE ANTITOXINA
CLOTRIDIUM CHAUVOEI	5.10° UFC DE ANTITOXINA

1 CEPAS PASTEURELLA	
PASTEURELLA MULTOCIDA	5.10° UFC DE ANTIDOXINA

## **VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS**

Vía subcutánea en: *Bovinos:* Aplicar 5 mL. *Ovinos y Caprinos:* 2 mL. En primo vacunación aplicar la primera dosis entre 3 y 4 meses de edad. *Revacunar a los 21 días y luego semestralmente para mantener niveles adecuados de protección. En hembras gestantes:* Aplicar en el último tercio de la gestación, para producir una excelente inmunidad calostral.

#### **PRESENTACIONES**







Reg. ICA 9954-BV



